

Posiadacz zezwolenia:

Sharda Polska Sp. z o.o., ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa, tel: 22 886 9328 lub 17 240 13 07, e-mail: eu.sales@shardaintl.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

Agrecol Sp.z o.o. Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: 62 7832 000, faks: 62 7844445, e-mail: agrecol@agrecol.pl

I N S E C O L A E

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

imidachlopyryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – **0,025% (0,25 g/l)**

Zezwolenie MRiRW nr R - 149/2015 z dnia 24.09.2015 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-469/2018d z dnia 11.09.2018 r.



Uwaga

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

P261 – Unikać wdychania par.

P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Insecol AE jest środkiem owadobójczym w formie dyspensera aerozolowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym zwalczania szkodników w niektórych roślinach ozdobnych uprawianych w szklarniach trwałych.

W roślinie działa systemicznie.

STOSOWANIE ŚRODKA

Gerbera (uprawiana w szklarniach trwałych).

mączlik szklarniowy

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.

Aerozolować całą roślinę z odległości 30-40 cm, tak aby była wilgotna, ale żeby nie spływały z niej krople.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **1**

Chryzantema ogrodowa (uprawiana w szklarniach trwałych)

mszyca wielożerna, wciornastek amerykański

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika

Aerolizować całą roślinę z odległości 30-40 cm, tak aby była wilgotna, ale żeby nie spływały z niej krople.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **1**

Kawowiec (uprawiany w szklarniach trwałych)

wełnowiec cytrusowiec

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.

Aerolizować całą roślinę z odległości 30-40 cm, tak aby była wilgotna, ale żeby nie spływały z niej krople.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **1**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. W czasie opryskiwania w ogrodach nie dopuścić do przedostania się środka na rośliny konsumpcyjne.
2. Przed zastosowaniem środka na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. Środka nie stosować w czasie silnego nasłonecznienia.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Zachować ostrożność - środek w pojemniku znajduje się pod ciśnieniem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów środek można stosować wyłącznie na rośliny uprawiane w szklarniach trwałych.

Zabrania się wysadzania do gruntu roślin traktowanych środkiem ochrony roślin Insecol AE

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia środka na powierzchni roślin.

Okres prewencji dla pszczoł (okres zapobiegający zatruciu):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
- w temperaturze 0°C - 30°C.

Chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej 50°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -